

MSD SALUD ANIMAL · VETERINARIA

Nuflor – florfenicol inyectable

Cód. V010023

Antibiótico inyectable de amplio espectro a base de florfenicol.

Características

- Especie: Bovinos, Porcinos
- Acción Farmacológica: Antibacterianos
- Contenido: 100 ml.
- Aplicación: Inyectable
- Composición: Cada ml. contiene: Florfenicol: 300 mg. N-Metil-2-Pirrolidona: 250 mg. Propilenglicol: 150 mg. Polietilenglicol: 300 c.s.

Descripción

Antibiótico en solución inyectable que contiene florfenicol, antimicrobiano de amplio espectro. El Florfenicol es un antibiótico sintético de amplio espectro, activo contra bacterias Gram positivas y Gram negativas de los animales domésticos. El Florfenicol actúa por inhibición de la síntesis de proteínas bacterianas a nivel de los ribosomas. El Florfenicol es activo contra las bacterias patógenas más comúnmente implicadas en la Enfermedad Respiratoria Bovina: Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Haemophilus somnus. También contra Corynebacterium pyogenes, E. coli, Salmonellas, Streptococos, Staphilococos.Activo contra Bacteroides nodosus y Bacteroides melaninogenicus, productores del Pietín. La administración intramuscular de la formulación a la dosis recomendada de 20 mg/kg mantiene niveles en sangre efectivos durante 48 horas. La aplicación SC de 40 mg/kg mantiene estos valores a niveles terapéuticos por 96 hs. En porcinos Nuflor es efectivo contra los siguientes agentes etiológicos: Actinobacillus pleuroneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyoneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Salmonella cholerasuis, Streptococus suis Tipo II. Indicaciones: – Bovinos: nfermedades de los bovinos causadas por bacterias sensibles al Florfenicol. Tratamiento de enfermedades respiratorias. Diarreas de terneros, Pietín, Queratitis, infecciones del tracto genital, e infecciones en general. – Porcinos: Tratamientos de enfermedades respiratorias.

Modo de uso

Bovinos: 20 mg/kg de peso corporal (1 ml/15 kg), en dos aplicaciones con 48 hs de intervalo. El punto preferido es la musculatura del cuello. Alternativamente puede aplicarse una sola dosis subcutánea de 40 mg/kg de peso corporal (2 ml/15 kg). Vía de administración: intramuscular. Porcinos: 15 mg/kg (0,05 ml/kg) en dos aplicaciones con 48 hs de intervalo. No aplicar más de 15 ml del producto en cada punto de inoculación. Vía de administración: intramuscular. Efectos secundarios: Una disminución del consumo alimentario puede ser observada durante el tratamiento, desapareciendo una vez finalizado el mismo. En caso de sobredosificación se puede observar un ligero ablandamiento de las heces, el cual desaparece si se suspende el tratamiento.

Restricciones de uso: No administrar en toros adultos destinados a la reproducción. Tiempo de retiro en carne: En bovinos no aplicar el producto 28 días antes del sacrificio. En porcinos no aplicar el producto 9 días antes del sacrificio.

Presentación

Frasco x 100 ml

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.