

ZOETIS · VETERINARIA

Terramicina Solución Inyectable

Cód. V010032

Antibiótico inyectable a base de oxitetraciclina para infecciones bacterianas: carbunclo, mancha, neumoenteritis, leptospirosis, pietín, anaplasmosis y metritis.

Composición

- Oxitetraciclina: 5 g.
- Excipientes c.s.p.: 100 ml.

Indicaciones

Solución de Clorhidrato de Oxitetraciclina en Propilenglicol, perfectamente estéril y estable, lista para usar. Terramicina es la marca de fábrica para la Oxitetraciclina, un antibiótico de amplio espectro, eficaz contra bacterias, Mycoplasmas y protozoos de importancia en Medicina veterinaria.

La Oxitetraciclina se absorbe perfectamente por vía parenteral y oral,alcanzando altos niveles de antibiótico en los tejidos.

Vacunos: Carbunclo Bacteridiano, Carbunclo Sintomático (Mancha de los terneros), Septicemia Hemorrágica, Fiebre de Transporte, Neumonoenteritis, mastitis (Septicémica aguda), Leptospirosis, Actinomicosis, Actinobacilosis, Pietín, Anaplasmosis, metritis y en general infecciones no específicas como neumonías, bronquitis, pleuresía, pericarditis traumática, peritonitis, infecciones génito urinarias y como tratamiento pre y post operatorio. Lanares: Carbunclo bacteridiano, fases iniciales del Carbunclo Sintomático (Mancha), Neumonía Infecciosa, Enterotoxemia y en general, en todas las infecciones no específicas causadas por gérmenes sensibles a la Terramicina.

Equinos: Carbunclo Bacteridiano, Adenitis Equina, neumonía, bronquitis, pleuresía y, en general, en todas las infecciones no específicas causadas por gérmenes sensibles a la Terramicina.

Porcinos: Neumonía, Paratifosis, metritis, septicemias, complicaciones bacterianas de enfermedades producidas por virus.

Perros y Gatos: Neumonía, bronquitis, pleuresía, peritonitis, complicaciones bacterianas del Distemper (Moquillo) y, en general, en todas las infecciones no específicas causadas por gérmenes sensibles a la Terramicina.

Conejos: Coriza, Pasteurelosis, mamitis, neumonía y, en general, en todas las enfermedades infecciosas no específicas, causadas por gérmenes sensibles a la Terramicina.

Aves: Enfermedad Crónica Respiratoria, Coriza infecciosa (Moquillo), Cólera, Tifus, Espiroquetosis, Sinusitis Infecciosa y complicaciones bacterianas de enfermedades víricas.

Modo de uso

Vía intramuscular o subcutánea:

Grandes animales: 3 a 5 mg por kg de peso vivo.

Medianos animales: 6 a 8 mg por kg de peso vivo.

Pequeños animales: 10 mg por kg peso vivo.

Vía intrauterina: Grandes animales: 10 a 20 ml.

Medianos animales: 10 ml.

Caninos: 5 a 10 ml.

Vía Oral:

Bovinos (de 100-250 kg): 10 ml disuelto en igual cantidad de agua.

Porcinos (de 5 a 10 kg): 5 ml disueltos en igual cantidad de agua.

Debido a su especial elaboración, Terramicina Solución inyectable es un antibiótico de gran versatilidad, que puede ser administrado par las siguientes vías: inyección subcutánea, intramuscular o endovenosa (Además, en algunos casos especiales tales como abscesos, actinomicosis, actinobacilosis, pietín, etc., la infiltración local de la lesión con la droga puede resultar de gran utilidad).

Especies

- Bovinos, Equinos, Porcinos, Caninos, Felinos, Aves, Conejos.

Precauciones y restricciones

Deben transcurrir 21 días entre la última aplicación de Terramicina y el sacrificio de los bovinos con destino a consumo humano.

No debe administrarse a animales en producción de leche, con destino a consumo humano o industrialización.

Deberán transcurrir 28 días entre la última aplicación de Terramicina y el sacrificio de los porcinos con destino a consumo humano.

Deberán transcurrir 5 días entre la última aplicación de Terramicina y el sacrificio de las aves para consumo humano.

No administrar a aves ponedoras a menso que los huevos se destinen a incubación.

Deben transcurrir 20 días entre la última aplicación de Terramicina y el sacrificio de conejos, nutrias o liebres con destino a consumo humano.

Presentación

Frasco x 250 ml

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.