


MSD SALUD ANIMAL · VETERINARIA

# Cobactan LC – intramamario para mastitis clínica (caja x 15 jeringas)

Cód. V010074

Antibiótico intramamario a base de cefquinoma para la mastitis clínica en vacas en lactancia.

## Descripción

Antibiótico de uso intramamario contra mastitis clínica.

## Indicaciones de uso

Tratamiento de las mastitis clínicas en vacas lecheras en lactación, causadas por bacterias susceptibles a la Cefquinoma:

Salmonella spp; Haemophilus spp; Pasteurella spp; Klebsiella spp; Corynebacterium pyogenes; Escherichia coli; A. pleuropnemoniae; Proteus mirabilis; Staphylococcus aureus; Streptococcus dysgalactiae; Streptococcus uberis; etc.

## Administración y dosis

Luego de ordeñar, infundir suavemente el contenido de una jeringa dentro del canal del pezón del cuarto infectado cada 12 horas, aplicando en total 3 jeringas.

Procedimiento: Ordeñar a fondo el o los cuartos afectados, limpiar y desinfectar minuciosamente el pezón y su orificio infundir suavemente el contenido total de una jeringa dentro de cada cuarto infectado dispersar el producto, masajeando suavemente el pezón y la ubre del animal afectado

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

## Precauciones que debe tomar el operador

Las penicilinas y las cefalosporinas pueden causar hipersensibilidad (alergia), siguiente a la inyección, inhalación, ingestión o contacto con la piel. La hipersensibilidad a las penicilinas puede llevar a sensibilidad cruzada a las cefalosporinas y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser ocasionalmente serias.

No manipular este producto si sabe que usted es sensible o si usted ha sido advertido de no trabajar con estas preparaciones.

Manipular este producto con gran cuidado para evitar la exposición, tomando todas las precauciones.

Si usted desarrolla los síntomas siguientes a la exposición tales como irritación de la piel, buscar ayuda médica y mostrar al médico esta advertencia. Los síntomas más serios pueden ser: hinchazón de la cara, labios, ojos, o dificultad para respirar y requieren urgente atención médica.

## Restricciones de uso

Entre el último tratamiento y el sacrificio de las vacas para consumo alimentario humano deben transcurrir por lo menos 48 horas.

La leche obtenida durante el tratamiento debe ser descartada. Entre el último tratamiento y el destino de la leche para consumo humano o industrial, deben transcurrir por lo menos 84 horas (7 ordeñes). Recién puede destinarse a consumo o industria la leche obtenida a las 96 horas post-tratamiento (8º ordeñe).

## Advertencias

Este producto puede dar falsos positivos al Test de screening de inhibidores en leche. En tal caso se recomienda la confirmación del resultado por algún método específico.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Contraindicaciones** | No debe administrarse en animales que presenten hipersensibilidad a las cefalosporinas |
| **Condiciones de conservación** | Mantener el producto en su envase original, entre 5 y 25°C |

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.