

ZOETIS · VETERINARIA

Excede Porcinos – ceftiofur inyectable

Cód. V010081

Antibiótico de amplio espectro (ceftiofur) en suspensión inyectable para cerdos, de acción prolongada con una sola dosis.

Composición

- Cada mL de esta suspensión estéril lista para usar contiene:
- Ceftiofur ácido libre cristalino equivalente a 200 mg de ceftiofur, en una suspensión a base de MiglyolR y aceite de semilla de algodón.

Indicaciones

Excede es un antibiótico de amplio espectro, del grupo de las cefalosporinas, activo contra bacterias patógenas Gram + y Gram -, incluyendo a las cepas productoras de betalactamasa.

El ceftiofur, es bactericida, se caracteriza por su mecanismo de acción, el cual inhibe la síntesis de la pared celular.

La exclusiva formulación de Excede, permite que con una sola dosis se alcancen concentraciones de ceftiofur contra patógenos sensibles a esta droga, por encima de la CIM durante 7 días post aplicación. Asegurando así el tratamiento.

EXCEDE Suspension Esteril esta indicado para el tratamiento de BRD (Fiebre del Transporte, Neumonia) asociada con Mannheimia haemolytica, P. multocida y H. somnus. EXCEDE Suspensión Estéril ademas esta indicado para el control de la enfermedad respiratoria bovina en animales con alto riesgo de contraer BRD asociado con Mannheimia haemolytica, P. Multocida y H. somnus. Pietin. Control de la metritis posparto en vacas con riesgo de desarrollarla.

El uso de Excede Suspensión Estéril está contraindicado en animales hipersensibles a la droga.

ADVERTENCIAS SOLO PARA USO EN ANIMALES. NO UTILIZAR EN HUMANOS. UTILIZAR DE ACUERDO A LAS INDICACIONES.

Las penicilinas y cefalosporinas pueden causar reacciones alérgicas en individuos sensibles. La exposición a tales antimicrobianos, inclusive ceftiofur, puede provocar reacciones alérgicas leves a severas en algunos individuos. La exposición reiterada o prolongada puede dar lugar a sensibilización. Evitar el contacto directo del producto con la piel, los ojos, la boca y la indumentaria. Es recomendable utilizar guantes de látex. Aquellas personas hipersensibles a la penicilina o a las cefalosporinas deben evitar la exposición al producto. En caso de contacto accidental con los ojos, enjuagar con agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, enjuagar con agua y jabón. Retirar la indumentaria contaminada. Si se presenta reacción alérgica (ej.: sarpullido, urticaria, respiración dificultosa), consultar al medico. La hoja de seguridad contiene información mas detallada sobre seguridad en humanos. Para comunicar efectos adversos, obtener mayor información sobre el producto o datos sobre seguridad, llamar al 0800-555-7000.

La inyección de EXCEDE Suspensión Estéril en las arterias auriculares conllevan a la muerte súbita del animal.

Modo de uso

TRATAMIENTO

Administrar una única inyección subcutánea en la parte dorsal próxima a la base de la oreja del ganado de carne o del ganado lechero a una dosis de 6,6 mg de ceftiofur/ kg de peso corporal (1 mL de EXCEDE suspensión estéril cada 30 kg de peso corporal). La mayoría de los animales responden al tratamiento dentro de los tres a cinco días. Si no se observan mejoras, deberá realizarse una nueva evaluación.

CONTROL

Los estudios clínicos indican que la administración de EXCEDE Suspensión Estéril es efectiva para el control de la enfermedad respiratoria, en bovinos con “alto riesgo” de contraerla. Uno o mas de los siguientes factores describen la condición de los terneros con alto riesgo de contraerla a su arribo:

Animales procedentes de diferentes establecimientos

Periodos prolongados en el tiempo de transporte (con poco o ningún momento de descanso)

Diferencias en la temperatura desde la procedencia y hasta el lugar de destino de 10°C o mas

Animales expuestos a condiciones de humedad o frío extremos

Poca distancia entre animales durante el transporte o procedimientos estresantes al arribo (castración, descorne) Cuadro 1.

Agitar bien antes de usar. Leer el prospecto en su totalidad antes de proceder a la administración de EXCEDE Suspensión Estéril por vía SC.

Aplicar una única inyección SC en la parte dorsal próxima a la base de la oreja, procurando evitar todos los vasos sanguíneos.

Calcular el punto de inserción de la aguja para evitar inyectar en vasos sanguíneos o lugares en que previamente se colocaron implantes o caravanas.

No administrar por vía intra-arterial.

Aplicar la totalidad del contenido de la jeringa.

Al administrar EXCEDE Suspensión Estéril de manera correcta, aparece una ampolla subcutánea.

Al retirar la aguja, presione el punto de inserción y masajee en dirección a la base de la oreja.

Gráfico 2. Administración subcutánea de EXCEDE Suspensión Estéril en la parte posterior de la oreja, donde se implanta a la cabeza (base de la oreja)

Gráfico 3: Ubicación de la inyección para la administración subcutánea de EXCEDE Suspensión Estéril en la parte posterior de la oreja, donde se implanta a la cabeza (base de la oreja).

Para mas información consultar el prospecto.

Especies

- Porcinos

Precauciones y restricciones

Porcinos 14 días.

Presentación

Frasco x 100 ml

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.