

VON FRANKEN · VETERINARIA

Cefaximin L – pomo intramamario de lactancia

Cód. V010138

Pomada intramamaria para mastitis en lactancia, a base de rifaximina y cefacetril, con alta actividad frente a Staphylococcus aureus.

Indicaciones

Pomada antimastítica intramamaria para la terapia en lactación.

La Rifaximina es una exclusiva molécula de FATRO ITALIA. Una de las drogas con mayor actividad frente a Staphylococcus aureus. No atraviesa las barreras orgánicas, alcanzando concentraciones por encima de la CIM por un tiempo prolongado. En asociación con Cefacetril otorga gran poder sinérgico y una eficacia realmente distintiva.

Estudios locales e internacionales avalan su eficacia terapéutica en tratamientos cortos de 1 y/o 2 pomos.

Composición

- Una jeringa de 5 ml contiene:
- Rifaximina: 0,10 g
- Cefacetril sódico: 0,20 g
- Excipientes c.s.p: 5,00 ml

Modo de uso

1 o 2 jeringas por cuarto (cada 12 o 24hs), dependiendo del grado de mastitis.

Precauciones y restricciones

Carne: 5 días.

Leche: 84 horas

Información Técnica

Eficacia de la rifaximina + cefacetril sódico

Eficacia de la rifaximina + cefacetril sódico (CEFAXIMIN-L) en el tratamiento de las mastitis subclínicas causadas por Staphylococcus aureus

Terapia extendida

Terapia extendida a base de Rifaximina y Cefacetril para el tratamiento de infecciones mamarias subclínicas causadas por Staphylococcus aureus durante la lactancia

Presentación

1 jeringa (caja x 20)

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.