

ZOETIS · VETERINARIA

DIB 1 g – dispositivo intravaginal bovino

Cód. V010182

Dispositivo intravaginal con 1 g de progesterona para sincronización de celo y tratamiento del anestro en vacas y vaquillonas.

Composición

- Progesterona ..... 1,0 g
- Silicona inerte ..... c.s.

Indicaciones

La progesterona liberada a partir de la colocación del dispositivo tiene un rol importante sobre la dinámica folicular ovárica, los niveles supraluteales (> 1ng/ml) obtenidos a los pocos minutos de la introducción del dispositivo provocan la regresión del folículo dominante y aceleran el recambio de las ondas foliculares, este cese de la secreción de productos foliculares (estrógeno e inhibina) produce el aumento de FSH que va a ser responsable del comienzo de la emergencia de la siguiente onda folicular. Por otro lado, la extracción del dispositivo provoca la caída de progesterona a niveles subluteales (< 1ng/ml) que inducen el incremento de la frecuencia de los pulsos de LH, el crecimiento y la persistencia del folículo dominante con concentraciones muy altas de Estradiol que provocan por un lado el celo y a nivel endócrino inducen finalmente el pico de LH que es seguido por la ovulación.

Control del ciclo estral en vaquillonas y vacas.

Tratamiento del anestro post-parto.

Acortamiento del período parto concepción.

El producto se aplicará de acuerdo a los siguientes programas:INDICACIÓNDÍA 0DÍA 6DÍA 7DÍA 8DÍA 9DÍA 10AnestroID+BE2PG RD+eCG+PGBE1IACelo silenciosoID+BE2RD IA Ovario quísticoIDPG RDIASincronización de celoID+BE2RD+PGBE1IATF REFERENCIAS:ID = Insertar dispositivoRD = Retirar dispositivoBE1 = Aplicar 1 mg de Benzoato de Estradiol (Gonadiol®)BE2 = Aplicar 2 mg de Benzoato de Estradiol (Gonadiol®)eCG = Aplicar 400 a 500 UI de Gonadotrofina Coriónica Equina (Novormon®)PG = Aplicar 500 µg (2 ml) de Cloprostenol (Ciclase®)En vaquillonas reducir la dosis en ambos casos.IA = Inseminación artificialIATF = Inseminación artificial a tiempo fijo.- Resincronización de los retornos al servicio o IA.Es posible realizar una resincronización a fin de detectar los animales que no hayan quedado preñados. A este fin sereinsertan los dispositivos el día 13 (día 0 = IA), se retiran el día 20 y se insemina a celo detectado los días 21 a 25. Los programas de uso pueden ser modificados de acuerdo al criterio de Médico Veterinario actuante.

No utilizar en animales con anormalidades vaginales.

Precauciones y restricciones

Se recomienda lavar y desinfectar el aplicador luego de cada uso. En caso de reutilización de dispositivos es necesario lavar y desinfectar los mismos antes de su reinserción.

En animales de pobre condición corporal es posible no obtener el efecto esperado.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No posee

Modo de uso

PASO 1: Tomar el aplicador por su extremo libre e introducir el (D.I.B.)

PASO 2: Asegurarse de que el DIB quede perfectamente calzado en el canal vaginal del aplicador con la colita extractora sobresaliendo.

PASO 1: Tomar el aplicador cargado e introducirlo en la vagina previamente higienizada. Una vez que llegue al fondo de la vagina presionar el émbolo para descargar el DIB y retirar luego el aplicador vacío.

Es recomendable realizar la desinfección de los aplicadores antes de su uso y entre animal y animal. A este fin se deben utilizar desinfectantes aprobados, especialmente aquellos en base a amonios cuaternarios.

Presentación

Bolsa x 10 dispositivos

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.