

MSD SALUD ANIMAL · VETERINARIA

Halocur – halofuginona oral para terneros (980 ml)

Cód. V010189

Solución oral a base de halofuginona para la prevención y el tratamiento de la criptosporidiosis en terneros.

Descripción

Halocur®, se propone un esquema de dosificación simplificado:

Terneros de 35 a 45 kg: 8 ml de Halocur ® una vez al día durante 7 días consecutivos.

Terneros de 45 a 60 kg: 12 ml de Halocur ® una vez al día durante 7 días consecutivos.

Para animales más livianos o pesados, se debe realizar un cálculo preciso (2 mL/10 kg).

En granjas con historia de criptosporidiosis el producto puede ser utilizado para el control de diarrea debido al diagnóstico de Cryptosporidium parvum.

La administración debe comenzar las primeras 24 a 48 horas de vida.

Para la reducción de diarrea debido al diagnóstico de Cryptosporidium parvum la administración debe comenzar dentro de 24 horas iniciada la diarrea.

Para asegurar una correcta dosificación, es posible utilizar un aplicador especializado no incluido en el producto. Se debe evitar la contaminación del producto durante la dosificación, para lo cual se recomienda no reutilizar jeringas.

El tratamiento consecutivo debe ser realizado a la misma hora cada día.

Una vez que el primer ternero ha sido tratado, los próximos terneros recién nacidos deben ser sistemáticamente tratados con la dosis y frecuencia indicada, mientras se presente el cuadro producido por Cryptosporidium parvum en el plantel.

Contraindicaciones

- No administrar el producto en animales con el estómago vacío.
- No utilizar en caso de diarrea establecida por más de 24 horas y en animales débiles.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Para el tratamiento de terneros anoréxicos, el producto debe administrarse diluido en medio litro de una solución de electrolitos. Los animales deben recibir suficiente calostro de acuerdo con las buenas prácticas de crianza.

Sobredosificación: En vista de que los síntomas de toxicidad pueden ocurrir si se administra el doble de la dosis terapéutica, es necesario administrar estrictamente la dosis recomendada. Los síntomas de toxicidad incluyen diarrea, sangre visible en heces, disminución del consumo de leche, deshidratación, apatía y postración. Si se observan signos clínicos de sobredosificación, el tratamiento debe suspenderse de inmediato y se debe

alimentar al animal con leche o un sustituto de leche no medicados. Es probable que se requiera la rehidratación.

Precauciones especiales para la persona que administra el medicamento de uso veterinario a los animales

El contacto repetido con el producto puede provocar alergias en la piel.

Evite el contacto del producto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel y los ojos, lave cuidadosamente la zona expuesta con agua limpia. Si la irritación ocular persiste, consulte a un médico.

Utilice guantes protectores al manipular el producto.

Lávese las manos después de utilizar el producto.

Evite la introducción de contaminantes.

Periodo de retiro

- Carne: 13 días.
- Almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente, protegido de la luz a una temperatura entre 15° y 25°C.

Modo de uso

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.