

BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

Aciendel – pour-on de cipermetrina x 5 l

Cód. V010209

Antiparasitario externo pour-on a base de cipermetrina para bovinos, equinos, ovinos y porcinos. Control y tratamiento de ectoparásitos: piojos chupadores y masticadores, y mosca de los cuernos en bovinos, ovinos, equinos y porcinos.

Acción

Antiparasitario externo pour-on a base de cipermetrina para bovinos, equinos, ovinos y porcinos. Su característica más importante es la persistencia de su acción antiparasitaria y repelente, lo que le otorga un prolongado poder residual.

Composición

Cipermetrina, 6 g; excipientes, c.s.p. 100 mL

Indicaciones

Control y tratamiento de ectoparásitos: piojos chupadores y masticadores, y mosca de los cuernos en bovinos, ovinos, equinos y porcinos.

Piojos: el tiempo necesario para la eliminación parasitaria es de 4 a 6 semanas. En ovinos adultos, los tratamientos deben realizarse dentro de los 45 días despues de la esquila. Los corderos pueden tratarse en cualquier momento.

Dosis y vía de administración

Bovinos: 10 mL hasta 400 kg de p.v. y 20 mL para animales de más de 400 kg de p.v. Las dosis se pueden modificar según criterio profesional.

Ovinos y porcinos: 5 mL por animal.

Equinos: 20 mL, repartidos de la siguiente forma: 5 mL en la tabla del cuello y pecho y 5 mL en cada flanco e ijar. Aplicar por derrame cutáneo dorsal (pour-on).

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Período de retiro

Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir 6 días. Entre el último tratamiento y el ordeñe para el consumo humano y/o industrialización de la leche deben transcurrir 6 hs.

Recomendaciones

No aplicar con amenaza de lluvia. En caso de producirse lluvias dentro de las 24 hs. de la aplicación, repetir el tratamiento.

Presentación

Bidones dosificadores de 1 L. Bidones de 5 L.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales. Imagen ilustrativa.