

MSD SALUD ANIMAL · VETERINARIA

Cobactan 7,5 % – cefquinoma inyectable de acción prolongada (100 ml)

Cód. V010246

Antibiótico inyectable a base de cefquinoma al 7,5 %, de acción prolongada, para bovinos.

Descripción

Suspensión Antibiótica de amplio espectro y larga acción.

Cefquinoma es un antibiótico del grupo de las cefalosporinas que actúa por inhibición de la síntesis de la pared celular. Se caracteriza por un amplio espectro de actividad terapéutica. Por ser una cefalosporina de cuarta generación, combina una alta penetración celular con una alta estabilidad contra beta-lactamasas.

Indicaciones

Tratamiento de enfermedades respiratorias causadas por bacterias sensibles a cefquinoma en bovinos y cerdos, particularmente aquellas causadas por Mannheimia haemolytica

(antes

Pasteurella haemolytica),

Pasteurella multocida e Histophilus somn i (antes

Haemophilus somnus). El espectro de actividad de cefquinoma también incluye a Escherichia coli, Citrobacter sp., Klebsiella sp., Proteus sp., Salmonella sp., Serratia marcescens, Arcanobacterium pyogenes, Corynebacterium sp., Staphylococcus aureus, estafilococos coagulasa negativos,

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus bovis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Haemophilus parasuis.

Dosis

Bovinos: Administrar 2,5 mg de cefquinoma por kg de peso, equivalente a 1 ml/30 kg de peso por vía subcutánea.

Cerdos: Administrar 3 mg de cefquinoma por kg de peso, equivalente a 1 ml/25 kg de peso por vía intramuscular. Tratar a los animales luego la aparición de los primeros signos clínicos y evaluar la res puesta durante las 48 horas posteriores a la administración. Si los signos clínicos de enfermedad respiratoria persisten, se recomienda administrar una segunda dosis luego de 48 horas.

Administración

Para asegurar una correcta dosificación y evitar cualquier posible subdosificación, se debe determinar el peso de los animales en forma tan precisa como sea posible. Se recomienda dividir la dosis de forma que el volumen de inyección no supere los 10 ml en el caso de bovinos, 3 ml en el caso de los cerdos por el sitio de inyección

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Contraindicaciones

No administrar a animales con hipersensibilidad a las cefalosporinas y otros antibióticos betalactámicos.

Reacciones adversas

La inyección subcutánea de un producto medicinal induce una reacción inflamatoria en el sitio de inyección. Las lesiones causadas por la inyección pueden perdurar hasta 28 días después de la última dosis.

En caso de reacciones adversas, consulte con un profesional veterinario.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

El uso del producto se debería basar en pruebas de susceptibilidad.

Las penicilinas y cefalosporinas en general pueden producir hipersensibilidad (alergia) luego de su administración, inhalación, ingestión o contacto con la piel. La hipersensibilidad a las penicilinas puede dar lugar a sensibilidad cruzada con las cefalosporinas y viceversa. Las reacciones alérgicas a estas sustancias pueden ser serias.

Las personas alérgicas a estas sustancias no deberían manipular el producto.

Usar el producto con cuidado para evitar la exposición, tomando todas las precauciones pertinentes.

Si la persona que administra el producto desarrolla síntomas luego de la exposición, tales como salpullido, debería acudir al médico y mostrarle estas advertencias. Signos como hinchazón de la cara, labios, ojos o dificultad para respirar son más serios y requieren de atención médica urgente.

No existe evidencia de toxicidad reproductiva (ni teratogenicidad) en bovinos. Los estudios en ratas y conejos no mostraron efectos teratogénicos, fototóxicos ni maternotóxicos.

Período de restricción

- Bovinos: 13 días
- Cerdos: 7 días
- No utilizar en vacas de tambo durante la lactación o período seco.
- Almacenamiento
- Conservar entre 15 y 25°C.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.