

BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

Floroxin – florfenicol 30 % inyectable x 100 ml

Cód. V010253

Antibiótico inyectable de amplio espectro (florfenicol 30 %) para bovinos y porcinos, activo frente a bacterias Gram positivas y negativas.

Acción

Antibiótico de amplio espectro para bovinos y porcinos, activo frente a bacterias Gram positivas y negativas.

Composición

Florfenicol, 30 g; excipientes, c.s.p. 100 mL

Indicaciones

Bovinos: Enfermedad respiratoria bovina (fiebre del embarque): Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni, diarreas de los terneros (síndrome diarreico), Escherichia coli ET y cuadros neumoentéricos: Corynebacterium pyogenes, Salmonella spp, Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Klebsiella spp. Pododermatitis (Pietin): Fusobacterium necrophorum, Bacteroides nodosus, Bacteroides melaninogenicus. Queratoconjuntivitis infecciosa bovina incluyendo Moraxella spp. Infecciones del aparato genital (Metritis, piómetras y endometritis) e infecciones en general.

Porcinos: Enfermedades del tracto respiratorio (Actinobacillus pleuropneumoniae), neumonía enzoótica (Haemophilus influenzae). Rinitis atrófica (Pasteurella multocida, Bordetella Bronchiseptica). Diarreas causadas por Escherichia coli, Salmonella spp. Infecciones del aparato genital (metritis, piómetras) y síndrome de metritis, mastitis, agalactia (M.M.A).

Dosis y vía de administración

Bovinos: Vía Intramuscular: 20 mg/Kg de p.v. (1 mL/15 Kg), repetir a las 48 hs. Vía subcutánea: 40 mg/Kg de p.v. (2 mL/15 Kg), única dosis. No aplicar más de 10 mL en cada sitio de inyección.

Porcinos: Vía Intramuscular: 10 mg/Kg de p.v. (1 mL/30 Kg). Se recomienda aplicar 3 inyecciones con 24 hs de intervalo entre cada una ó 15 mg/Kg de p.v. (1,5 mL/30 Kg p.v.) por vía intramuscular. Aplicar 2 inyecciones con intervalo de 48 hs entre cada una.

Sitio de inyección: preferentemente tabla del cuello cuando se aplica por vía Intramuscular. En Bovinos al aplicar por vía Subcutánea, se recomienda por delante o detrás de la paleta.

Período de retiro

No sacrificar animales para consumo humano hasta haber transcurrido 28 días desde el último tratamiento. No utilizar en hembras en lactancia cuya leche se destine a consumo humano y/o industrialización.

Presentación

Frasco x 100 mL.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.