

VETUE · VETERINARIA

Neumosulfa – sulfa y trimetoprim

Cód. V010271

Antibacteriano de amplio espectro (sulfametazina y trimetoprim) para enfermedades respiratorias.

Características

- Especie: Aves, Bovinos
- Acción Farmacológica: Antimicrobianos, Quimioterápicos
- Contenido: 100 g., 1 kg., 5 kg., 25 kg.
- Aplicación: Oral
- Composición: Sulfametazina Sódica: 10 g. Trimetropim: 2 g. Excipientes c.s.p: 100 g.

Descripción

Es una asociación de Sulfametazina, sulfa de elección en el tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio y Trimetoprim, quimioterápico sinergizante de sulfonamidas, que convierte en bactericida de amplio espectro a esta combinación. Indicaciones: Agentes etiológicos susceptibles: Pasteurella multocida, Eimeria meleagrimitis, Eimeria adenoeides, Eimeria tenella, Eimeira necatrix, Haemophilus gallinarum, Fusobacterium necrophorum, Escherichia coli, Salmonella pullorum, Eimeria boris, Eimeria zuernii. Preventivo y curativo de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, genitourinarias y septicemicas causadas por gérmenes comprendidos en el espectro mencionado, por ej:Cerdos: neumonía por Haemophilus sp., rinitis atrófica, complicaciones bacterianas de virosis y micoplasmosis, colibacilosis, metritis, salmonelosis. Terneros: colibacilosis, neumoenteritis, onfalitis, coccidiosis. Aves: colibacilosis, coriza infecciosa, salmonelosis.

Modo de uso

– Curativa: Terneros lactantes y lechones: 3 gr. cada 10 Kg./pv., repartidos en dos dosis diarias, durante 5 a 7 días. Terneros en recría, cachorros y cerdos en engorde: 15 a 20 gr. cada 100 Kg./pv., el primer día, reduciendo la dosis a la mitad desde el segundo día, hasta llegar al sexto día de tratamiento. Aves: 1 gr. por litro de agua de bebida el primer día de tratamiento, y la mitad de esta dosis en los dos o tres días siguientes. – Preventiva: Ante factores climáticos o de stress predisponentes, dosificar en la mitad de las dosis curativas mencionadas. Vías de administración: Oral. Disolver en el agua de bebida o mezclar en la ración con cuidado para asegurar una correcta dosificación. Se puede utilizar el producto reconstituido dentro de las 24 horas de preparado. Advertencias y precauciones: Los animales medicados deben disponer agua de bebida a discreción. Replantear diagnostico si dentro de las 48 a 72 hs. de iniciado el tratamiento, no se observa la mejoría esperada. Restricciones de uso: No suministrar a animales con el funcionamiento renal restringido. El producto no puede ser administrado a aquellos animales que hayan demostrado antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. No administrar en aves en postura. Evitar su uso en hembras gestantes. Suspender el

tratamiento 10 días antes de la faena de ganado vacuno y pollos. Para cerdos suspender el tratamiento 15 días antes de la faena.

Peso: 0,1 kg

Presentación

Envase x 100 g

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.