

RÍO DE JANEIRO (ALLIGNANI HNOS.) · VETERINARIA

Vitamínico ADE Río de Janeiro – vitaminas y minerales inyectable (250 ml)

Cód. V030044

Suplemento vitamínico-mineral inyectable con vitaminas A, D3, E y B12, cobre, cobalto y hierro, para prevenir y corregir carencias.

Fórmula

- Cloruro de Cobalto hexahidrato 0,100 g
- Gluconato de Cobre anhidro 0,500 g
- Gluconato de Hierro dihidrato 0,125 g
- Difenhidramina Clorhidrato 1,500 g
- Vitamina A (palmitato) 0,220 g
- Vitamina E (acetato) 0,120 g
- Vitamina D3 (colecalciferol) 0,125 g
- Vitamina B12 (cianocobalamina) 0,005 g
- Vehículo c.s.p. 100 mL
- Equivalentes a: (1) 25 mg de Cobalto.
- (2) 70 mg de Cobre.
- (3) 15 mg de Hierro.
- (4) 400.000 UI de Vitamina A.
- (5) 120 UI de Vitamina E.
- (6) 5.000.000 UI de Vitamina D3.

Indicaciones

Prevención y/o tratamiento de estados carenciales de vitaminas y minerales. Como preventivo de hipovitaminosis de vitaminas A, D, E y/o B12. En deficiencias clínicas o subclínica de los minerales Cobre, Hierro y Cobalto. Como complemento vitamínico-mineral de animales en crecimiento, engorde o lactancia. En todos los casos de retrasos del crecimiento, desmejoramiento o animales desnutridos. Como complemento de tratamientos antiparasitarios. En todos los casos donde sea necesario un complemento vitamínico-mineral.

Datos generales

Acción terapéutica	Vitamínicos y Mineralizantes
Especies destinadas	Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Bubalinos, Camélidos sudamericanos y Dromedarios

Vía de administración

Parenteral por vía Subcutánea.

Dosis

- Bovinos, Porcinos, Bubalinos, Camélidos sudamericanos y Dromedarios adultos: 10 mL de producto por animal.
- Terneros, Ovinos y Caprinos: 5 mL de producto por animal.

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Intervalo entre dosis y Duración del tratamiento

Se recomiendan dos dosis con un intervalo de entre 3 y 7 días. Repetir el tratamiento cada 2 meses. Este intervalo puede modificarse según grado de carencia y criterio del profesional actuante.

Contraindicaciones y Precauciones de uso

No administrar por vía endovenosa.

Las reacciones alérgicas ya sea individual o de lote son muy raras, se dan por sensibilización previa de los animales a alguno de los componentes del producto. Pueden manifestarse de forma local o general. Tratar sistemáticamente con corticoides, antihistamínicos y/o adrenalina.

Datos técnicos

Forma farmacéutica	Solución inyectable
Tiempo de retiro – Pre-ordeñe	No posee
Tiempo de retiro – Pre-faena	No posee
Clasificación	Venta bajo receta
Conservación	No conservar por encima de 30 °C. Proteger de la luz

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.