

RÍO DE JANEIRO (ALLIGNANI HNOS.) · VETERINARIA

Estradiol 10 Río de Janeiro – benzoato de estradiol inyectable (10 ml)

Cód. V030122

Benzoato de estradiol inyectable para bovinos: infecciones uterinas posparto, retención de placenta y sincronización de celo.

Fórmula

- Estradiol Benzoato 0,1 g
- Vehículo c.s.p. 100 mL

Indicaciones

- Bovinos: Prevención y tratamiento de infecciones uterinas post-parto, involución uterina lenta, retención de placenta, inducción y sincronización de celo e inercia uterina.
- Caninos y Felinos: Inhibición de la anidación.

Nota

Según el Artículo 3° de la Resolución 118/2022 se prohíbe en todo el Territorio Nacional Argentino la administración en équidos de los productos veterinarios que contengan en su formulación estradiol y sus ésteres.

Datos generales

Acción terapéutica	Hormonales
Especies destinadas	Bovinos, Caninos y Felinos

Vía de administración

Parenteral por vía Intramuscular.

Dosis

- Bovinos: 5 a 10 mL por animal. En protocolos de inducción y sincronización del celo: 1 a 3 mL por animal.
- Caninos y Felinos: 0,01 mL por kg de peso vivo.

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Intervalo entre dosis

- Bovinos: Prevención y tratamiento de infecciones uterinas post-parto: Dosis única.
- Involución uterina lenta: Dosis única.
- Retención de placenta: 72 horas.
- Inercia uterina: 72 horas.

- Inducción y sincronización de celo: según protocolo utilizado y criterio del profesional.
- Caninos y Felinos: 12 horas.

Duración del tratamiento

- Bovinos: Prevención y tratamiento de infecciones uterinas post-parto: Dosis única.
- Involución uterina lenta: Dosis única.
- Retención de placenta: Se recomiendan 3 dosis.
- Inercia uterina: Se recomiendan 3 dosis.
- Inducción y sincronización de celo: Según protocolo utilizado y criterio del profesional.
- Caninos y Felinos: 4 dosis, 2 en el día 3 y 2 en el día 5 pos coito.

Contraindicaciones y Precauciones de uso

El uso prolongado de estrógenos puede llevar a la supresión de la función ovárica, inducir a la hipoplasia y al desarrollo de quistes ováricos.

Tiempo de retiro – Pre-faena

- No posee.
- Este producto no debe administrarse en animales productores de alimentos para consumo humano cuyos productos y/o subproductos se exporten a la Unión Europea y/o a otros países con requisitos equivalentes.

Datos técnicos

Forma farmacéutica	Solución inyectable
Tiempo de retiro – Pre-ordeñe	No posee
Clasificación	Venta bajo receta archivada
Conservación	No conservar por encima de los 30 °C. Proteger de la luz

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.