

MSD SALUD ANIMAL · VETERINARIA

Salix – furosemida inyectable (10 ml)

Cód. V060021

Diurético inyectable a base de furosemida.

Descripción

Salix® surtió óptimo resultado.

Equinos: Edemas en ubre, pre y post-partum, edemas prepuciales y escrotales, diversos edemas no inflamatorios, edemas caquécticos o debidos a la alimentación, edemas de heridas, picaduras de víboras, infosura, anasarca.

Bovinos: Edemas de la ubre (acumulación de líquido en el tejido subcutáneo de la ubre, pezones y pared abdominal), edemas caquécticos y parasitarios.

Caninos: Edema pulmonar y bronquial, hidropericardio e hidrotórax, ascitis (con y sin cirrosis hepática), edemas cerebrales no inflamatorios, edema renal y edema combinado (insuficiencia cardíaca con hidropericardio).

Dosificación

- Método
- Inyectable (endovenoso lento o intramuscular)
- Grandes animales
- 5 a 10 ml 1 ó 2 veces por día, a intervalos de 6-8 horas. Es aconsejable la dosificación intermitente durante 2-4 días, suspender y reiniciar a la semana siguiente.
- Pequeños animales
- ¼ a ½ ml por cada 5 kg de peso, 1 ó 2 veces por día en intervalos de 6-8 horas.

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Contraindicaciones

Glomerulonefritis aguda o insuficiencia renal aguda, anuria, hiperdosificación de digital, cirrosis hepática grave, urticaria. Hipopotasemia. En trastornos de la micción conviene emplear Salix ® con precaución por su acción intensa.

Restricciones de uso

Durante el tratamiento y las 48 horas posteriores a su finalización, los animales tratados no deben ser destinados a consumo humano. La leche producida durante el tratamiento y las 48 horas posteriores al mismo no debe destinarse al consumo humano ni a la industrialización.

Almacenamiento: Conservar entre 2 y 25°C.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.