

RÍO DE JANEIRO (ALLIGNANI HNOS.) · VETERINARIA

Acetrim – triamcinolona inyectable (10 ml)

Cód. V060025

Suspensión inyectable de triamcinolona para afecciones osteomusculares (artritis, bursitis, tendosinovitis) en equinos, caninos y felinos.

Fórmula

- Triamcinolona acetonido 0,6 g
- Vehículo c.s.p. 100,0 mL

Indicaciones

- Afecciones osteo-musculares: Artritis, Bursitis, Tendosinovitis, Miositis, Síndrome Reumatoide.
- Afecciones cutáneas: Dermatitis, Dematosis, Prurito, Eczemas, Alergias no específicas.

Datos generales

Acción terapéutica	Antiinflamatorios y Analgésicos
Especies destinadas	Equinos (no destinados a consumo alimentario humano), Caninos y Felinos

Vía de administración

Parenteral por vía Intramuscular, Subcutánea, Intraarticular e Intrasinovial.

Dosis

Las dosis indicadas son orientativas y deben ser evaluadas por el profesional actuante según la afección y estado del paciente.

Equinos: Por vía intramuscular y subcutánea es de 2 a 3 mL cada 100 kg p.v. Por vía intraarticular o intrasinovial es de 1 a 3 mL.

Caninos y Felinos: Por vía intramuscular y subcutánea es de 0,2 a 0,3 mL cada 10 kg p.v.

Por vía intraarticular o intrasinovial es de 0,2 a 1 mL. Realizar la aplicación en sucesivas inyecciones de 0,1 mL cada una.

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Intervalo entre dosis y Duración del tratamiento

Dosis única. En caso de ser necesario se puede realizar otra aplicación a los 15 días.

Contraindicaciones y Precauciones de uso

No debe utilizarse en animales con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, úlceras gastrointestinales o corneales, colitis ulcerativas, amiloidosis, diabetes mellitus ni con osteoporosis. No administrar a hembras en gestación y/o lactancia. No es conveniente su administración en enfermedades infecciosas bacterianas, virales y micóticas y sarna demodéctica. No administrar a animales destinados a consumo humano.

Usar con precaución cuando es aplicado por vía intraarticular.

Datos técnicos

Forma farmacéutica	Suspensión inyectable estéril
Tiempo de retiro – Pre-faena	No aplicar en animales cuya carne sea destinada a consumo humano
Clasificación	Venta bajo receta
Conservación	No conservar por encima de 25 °C. Proteger de la luz

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.