

BURNET · VETERINARIA

Dexametasona Burnet

Cód. V060037

Antiinflamatorio corticoide inyectable de acción potente y mínima acción mineralocorticoide, para procesos inflamatorios de origen no infeccioso.

Descripción

Dexametasona Burnet (antiinflamatorio neoglucogénico, potente esteroide de mínima acción mineralocorticoide, uso inyectable). Indicaciones: procesos inflamatorios de diversa etiología no infecciosa. Cetosis, terapéutica de apoyo a la vaca caída. Inductor del parto en vacas y ovejas. Hipersensibilidad y alergias en pequeños animales.

Características

- Composición: Dexametasona 21-fosfato disódico 200 mg., vehículo c.s.p. 100 mL.
- Acción: la dexametasona es un esteroide de mínima acción mineralocorticoide, veinte veces más potente que la prednisolona.
- Contraindicaciones: enfermedad cardíaca congestiva, disfunción renal, diabetes, osteoporosis, cataratas, enfermedades oculares y hembras preñadas.

Modo de uso

por vía intramuscular, endovenosa, subcutánea e intraarticular. Bovinos: 0,1 a 0,4 mL. / 10 kg. de peso, en dosis única. Inductor del parto: 10 mL. totales Equinos: 1,25 a 2,5 mL. por animal en estado de shock, por vía E.V., seguida de igual dosis de mantenimiento a intervalos de 1, 3, 6 o 10 horas, determinado por la condición del paciente. En casos de tratamientos prolongados, la dosis debería reducirse paulatinamente hasta discontinuarla. Porcinos: 0,1 a 0,4 mL. / 10 kg. de peso, en dosis única. Ovinos: 1 a 2 mL. en dosis única. Caninos y Felinos: Como antiinflamatorio: 0,5 a 1 mL. cada 5 kg. de peso, cada 24 horas. Dosis de shock: 0,5 a 1 mL. por kilo de peso por vía E.V. Aplicar según criterio del profesional actuante. Aplicar según criterio del médico veterinario.

Presentación

Frasco x 100 ml

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.