

VON FRANKEN · VETERINARIA

Benzoato de estradiol

Cód. V070003

Estrógeno para inducción y sincronización de celo, ovarios quísticos, celos silenciosos y anestro posparto en bovinos.

Indicaciones

Complemento en la inducción y sincronización de celos con progestágenos en bovinos. Tratamiento de ovarios quísticos. Celos silenciosos. Anestro post parto en bovinos.

Composición

- Benzoato de estradiol: 100 mg
- Excipientes c.s.p: 100 ml

Modo de uso

En IATF: aplicar 2 ml por vía intramuscular el día de la inserción del Dispocel y repetir 1 ml por vía intramuscular a las 24 horas de retirar el Dispocel.

Para otros usos según criterio profesional.

Precauciones y restricciones

Carne: 0 horas.

Leche: no administrar a vacas lecheras cuya leche se destine a consumo humano.

Condiciones de almacenamiento

Entre 15 y 30º C al abrigo de la luz.

Información Técnica

Comparación de dos protocolos de sincronización con proestro prolongado en receptoras de embriones bovinos

El objetivo del presente estudio fue evaluar la respuesta a dos protocolos de proestro prolongado (de 6 y 7 días) en receptoras de embriones.

Efecto de un protocolo de IATF con Proestro prolongado vs. un protocolo convencional e influencia del score genital, el peso vivo y la presentación de celo sobre el porcentaje de preñez.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la influencia de diferentes variables sobre las tasas de preñez logradas con la aplicación de dos protocolos, J-Synch y Convencional, en vaquillonas Barford de 15 meses de edad, en el noreste de la provincia de Santa Fe, Argentina.

Alternativas al uso de estradiol en programas de IATF en bovinos de carne

Los fármacos en base a estradiol (17beta-estradiol y sus ésteres) son utilizados de rutina en programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) en bovinos en la mayoría de los países fuera de la Unión Europea (UE),

Presentación

Frasco x 100 ml

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.