


MSD SALUD ANIMAL · VETERINARIA

Intertocine – oxitocina inyectable (50 ml)

Cód. V070016

Oxitocina inyectable para uso en partos y para la bajada de la leche.

Descripción

Oxitocina sintética.

- Intertocine-S contiene oxitocina sintética en una concentración de 10 U.I. por ml.
- No contiene impurezas vasopresora ni antidiurética.
- Acción
- Intertocine-S provoca contracciones del músculo liso uterino sensibilizado por estrógenos y de la glándula mamaria. También estimula la involución uterina. Intertocine-S está indicado tanto para grandes animales como para pequeños.

Indicaciones de uso

Intertocine-S se emplea para estimular las contracciones uterinas con el fin de facilitar el parto, para promover la involución del útero posparto y como ayuda en la expulsión de placentas retenidas y detritus. Como ayuda en el control de la hemorragia posparto y para promover la bajada de leche en casos de agalactia.

Dosis

- Yegua 0,5 – 5,0 ml (5 – 50 UI)
- Vaca 1,0 – 5,0 ml (10 – 50 UI)
- Oveja, cabra, cerda 0,5 – 3,0 ml (5 – 30 UI)
- Perra 0,2 – 1,0 ml (2 – 10 UI)
- Gata 0,1 – 0,5 ml (1 – 5 UI)

Administración

Administrar por inyección intramuscular o subcutánea, en caso necesario repetir a los 40 minutos.

Cuando se requiere de un efecto muy rápido, inyectar intravenosamente un cuarto de la dosis mencionada, diluida 1:10 con agua para inyección; administrar lentamente.

Debido a que la dosis puede ser repetida, se recomienda la administración inicial de dosis bajas, cualquiera sea la vía de administración, especialmente durante el parto. En animales posparto se pueden emplear dosis mayores.

Contraindicaciones y advertencias:

El uso de Intertocine-S está contraindicado en cualquier forma de distocia obstructiva.

Cuando Intertocine-S se utiliza como ayuda en el parto, se debe confirmar la dilatación del cérvix previo a la administración.

Dosis excesivas de Intertocine-S pueden demorar el parto debido a la producción de contracciones uterinas incoordinadas, las que interfieren con el avance del feto, especialmente en preñeces múltiples.

La adrenalina reduce el efecto de la oxitocina en el útero o la glándula mamaria. Por lo tanto, se debe evitar estresar a los animales para obtener un efecto completo de la oxitocina.

Almacenamiento: Conservar en lugar oscuro entre +2° a +8°C.

Luego del primer uso, utilizar dentro de una semana.

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Datos técnicos

Clasificación	Oxitócico

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.