

ZOETIS · VETERINARIA

Gonadiol – benzoato de estradiol

Cód. V070036

Análogo sintético del estradiol para protocolos de sincronización de celo en bovinos.

Modo de uso

Aplicar por vía intramuscular de acuerdo al siguiente esquema:

Anestro postparto: Administrar 1 mg de benzoato de Estradiol después del progestágeno.

Celo silencioso: Administrar 2mg de benzoato de Estradiol antes del progestágeno.

Sincronización de celo:

Administrar 2 mg de benzoato de Estradiol antes del progestágeno y 1 mg luego, después del progestágeno.

Vía intramuscular

Indicaciones

No posee a las dosis recomendadas.

Precauciones y restricciones

No posee.

No requiere período de retirada entre el tratamiento del animal y el sacrificio del mismo para consumo alimentario humano.

No se requiere período de retirada entre el tratamiento del animal y el destino de la leche a su industrialización o consumo humano.

En Argentina y Paraguay este producto no debe administrarse en animales productores de alimentos para consumo humano cuyos productos y/o subproductos se exporten a la Unión Europea y/o a otros países con requisitos equivalentes.

Presentación

Frasco x 100 ml

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.