

MSD SALUD ANIMAL · VETERINARIA

Bovilis Piliguard – vacuna contra la queratoconjuntivitis bovina

Cód. V070054

Vacuna para la prevención de la queratoconjuntivitis infecciosa bovina asociada a Moraxella bovis.

Descripción

Vacuna para la prevención de la Queratoconjuntivitis asociada a Moraxella bovis

Cada dosis contiene

- Moraxella bovis, Cepa EPP 63
- Moraxella bovis, Cepa FLA 64
- Moraxella bovis, Cepa SAH 38

Excipientes

- Preservante: Gentamicina
- Adyuvante oleoso

Indicaciones de uso

Para la prevención de la queratoconjuntivitis bovina asociada con la infección por Moraxella Bovis, expresando un piliado de cepas EPP 63, FLA 64 y SAH 38 en ganado sano.

Administración

Agítese antes de su uso. La vacuna puede ser expuesta a temperatura ambiente antes de la inyección. Inyectar una única dosis de 2 ml subcutáneamente o intramuscularmente en el cuello 3 ó 6 semanas antes de la temporada de la queratoconjuntivitis. Está recomendada la revacunación anual

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Advertencias y precauciones especiales de uso

Puede ocasionar el desarrollo de un granuloma que puede persistir por varias semanas.

Usar todo el contenido una vez abierto el envase.

No vacunar 60 días antes de faena. Se puede encontrar una reacción transitoria local en el lugar de inyección. Si se presenta anafilaxia administrar epinefrina. Puede ocurrir una reacción de hipersensibilidad al producto biológico y puede producir una reducción de producción láctea en la vaca en lactancia.

Preservativo: Gentamicina

Cuidados: Tener extremo cuidado al aplicar un inyectable de una vacuna con emulsión oleosa, en la mano o los dedos, ya que una inyección accidental puede causar una seria reacción local. Contactar inmediatamente al

médico en caso de ocurrir una inyección accidental.

Las jeringas y agujas deberán ser esterilizadas antes del uso y la inyección deberá ser hecha en un área limpia, seca y tomando precauciones por la contaminación. El contenido remanente de un frasco en uso deberá ser descartado al final de un día de vacunación. Los frascos utilizados deberán ser eliminados según la normativa vigente.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.