

BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

Bio-Carbogen 2 – vacuna contra carbunclo (por dosis)

Cód. V080007

Vacuna para prevenir el carbunclo bacteridiano en bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y equinos.

Composición

Cada 100 mL contiene: 900 millones de esporos no capsulados avirulentos de Bacillus anthracis, cepa 34 F2 Sterne, excipientes, c.s.p. 100 mL.

Indicaciones

Vacuna para la prevención del carbunclo bacteridiano en bovinos, ovinos, porcinos, caprinos y equinos.

Dosis y vía de administración

Bovinos y equinos: 2 mL.

Porcinos, ovinos y caprinos: 1 mL.

Vía: subcutánea.

Esquema de vacunación sugerido

Primovacunación: Se debe vacunar a todo bovino mayor de 3 meses de vida. La vacunación de ovinos, caprinos y porcinos debe ser considerada cuando conviven con rodeos de bovinos donde se manifiesten casos de carbunclo, y se vacunará sólo a los adultos.

Vacunaciones siguientes: Revacunar a los 6 meses o 12 meses según la prevalencia de la enfermedad en el establecimiento. Para casos de los llamados “campos malditos” (alta infección telúrica), la revacunación debe ser repetida a los 6 meses.

La fecha de vacunación debe ser estratégica en relación con la mayor casuística, que ocurre en verano; se recomienda por ende la vacunación en primavera.

Conservación

Mantener entre 2 ºC y 8 ºC al resguardo de la luz.

No congelar.

Presentación

Frascos de 100 mL y 250 mL.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.