

ZOETIS · VETERINARIA

One Shot Ultra 8 – vacuna

Cód. V080028

Vacuna para bovinos que ayuda a prevenir la mancha, la gangrena gaseosa, la enterotoxemia y la neumonía por Mannheimia haemolytica.

Descripción

El componente liofilizado es un preparado de cultivos completos inactivados de M. haemolytica propagados para incrementar la producción de leucotoxina y antígenos capsulares asociados a la célula. El componente líquido está compuesto por cultivos estandarizados inactivados de Clostridium chauvoei, Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. novyi, Cl. sordelli, y Cl. perfringens tipos C y D, con un adyuvante especial soluble en agua (Stimugen ™) para aumentar la respuesta inmune.

Indicaciones

One Shot Ultra 8 está destinado para la vacunación del ganado bovino sano como ayuda a la prevención de la pierna negra causada por Clostridium chauvoei; edema maligno causado por Cl. septicum; hemoglobinuria bacilar causada por Cl. haemolyticum, hepatitis necrótica infecciosa causada por Cl. novyi; gangrena gaseosa causada por Cl. sordellii; enterotoxemia y enteritis causada por Cl. perfringens tipo B, C y D, y pasteurelosis neumónica bovina causada por Mannheimia haemolytica tipo A1. Si bien Cl. perfringens tipo B no es un problema significante en Norteamérica, la inmunidad es proporcionada por el toxoide beta del tipo C y el toxoide épsilon del tipo D.

Precauciones y restricciones

1. Almacenar de 2° a 7°C. La exposición prolongada a temperaturas más altas pueden afectar la potencia de manera adversa. No congelar.

2. Utilizar la totalidad del contenido una vez abierto el frasco.

3. Emplear jeringas y agujas esterilizadas para administrar esta vacuna.

4. No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio.

5. No usar en ganado ovino.

6. Contiene formalina como conservante.

7. Puede observarse inflamación temporaria en el sitio de inyección luego de administrar la vacuna.

8. Al igual que muchas vacunas, puede ocurrir anafilaxis después del uso. Se recomienda un antídoto inicial de epinefrina, que deba seguirse con terapia de soporte apropiada.

9. Se ha demostrado que este producto resulta eficaz en los animales sanos. Es posible que no se obtengan una respuesta inmunológica protectora si los animales están incubando una enfermedad infecciosa, están mal nutridos o con parásitos, están bajo estrés debido a condiciones de transporte o ambientales,

inmunocomprometidos de alguna otra manera o si la vacuna no se administra de acuerdo con la Indicaciones de la etiqueta.

10. Informes de campo y un estudio clínico indican que puede presentarse una reducción en la producción de leche luego de la vacunación de las hembras lecheras en lactancia.

No vacunar dentro de los 21 días previos al sacrificio.

Modo de uso

1. Indicaciones generales: Se recomienda la vacunación de ganado bovino sano. Rehidratar asépticamente la bacterina-toxoide usando el frasco de diluyente acompañante, agitar bien, y administrar 2mL por vía subcutánea.

2. Primovacunación: El ganado bovino sano debe recibir una segunda dosis de 2 ml de Ultrachoice 8, entre 4 y 6 semanas después. En el caso de CI. haemolyticum, repetir la dosis cada 6 meses en animales posibles de ser expuestos a desafío.

3. Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis. Las buenas prácticas de manejo aconsejan la revacunación con OneShot cuando existen probabilidades de que los animales vuelvan a sufrir estrés o queden expuestos a desafío.

4. Debe implementarse un buen manejo sanitario de los animales.

Especies

- Bovinos.

Presentación

Frasco x 50 dosis

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.