


BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

# Rotatec J5 – vacuna contra diarrea neonatal (por dosis)

Cód. V080032

Vacuna para prevenir la diarrea neonatal del ternero por rotavirus y bacterias gram negativas, y la mastitis por coliformes en vacas de tambo.

## Composición

Emulsión oleosa inactivada de rotavirus bovino serotipos 6 y 10 y Escherichia coli J5.

## Indicaciones

Vacuna para la prevención del síndrome de la diarrea neonatal del ternero causado por rotavirus bovino y bacterias gram negativas; endotoxemias secundarias a infecciones por bacterias gram negativas y mastitis por coliformes en vacas de tambo.

## Dosis y vía de administración

3 mL vía intramuscular o subcutánea, en la tabla del cuello

## Esquema de vacunación sugerido

Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

Rodeos de cría. Vacas y vaquillonas (primovacunación): Primera dosis: séptimo mes de preñez. Segunda dosis: octavo mes de preñez.

Vacas y vaquillonas (revacunación): Aplicar una dosis al octavo mes de preñez. Se sugiere en rodeos con alta incidencia: primera dosis séptimo mes de preñez, segunda dosis octavo mes de preñez y una tercera dosis a las vacas cola de parición.

Tambo. Vacas y vaquillonas (primovacunación): Primera dosis: séptimo mes de preñez. Segunda dosis: octavo mes de preñez.

Vacas y vaquillonas (revacunación): Primera dosis: secado. Segunda dosis: preparto.

Para prevención de mastitis coliforme aplicar una tercera dosis al parto.

## Conservación

Mantener entre 2 ºC y 8 ºC al resguardo de la luz. No congela.

## Presentación

Frascos de 120 mL y 240 mL.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.