

BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

Policlostrigen – vacuna clostridial (por dosis)

Cód. V080049

Vacuna para bovinos y ovinos contra mancha, gangrena gaseosa, enterotoxemia, hepatitis necrótica, hemoglobinuria bacilar y muerte súbita. Incluye E. coli J5 contra endotoxemias.

Composición

Suspensión acuosa inactivada de bacterinas y toxoides de Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Clostridium sordelli, Clostridium perfringens tipo C y D, Clostridium novyi y Clostridium haemolyticum combinados con bacterina de Escherichia coli J5. La combinación de toxoide de Clostridium perfringens tipo C y toxoide de Clostridium perfringens tipo D confiere protección contra Clostridium perfringens tipo B.

Indicaciones

Vacuna para la prevención de las siguientes enfermedades en bovinos y ovinos causadas por clostridios: mancha, gangrena gaseosa, enterotoxemia, hepatitis necrótica infecciosa, hemoglobinuria bacilar y muerte súbita. Prevención de cuadros de endotoxemia producidos por bacterias gram negativas

Dosis y vía de administración

Bovinos: 5 mL.

Ovinos: 3 mL.

Vía: subcutánea.

Esquema de vacunación sugerido

Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez): P2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

Bovinos: Terneros/as: primera dosis a los 2 meses de vida. Segunda dosis a los 3 meses de vida (antes de la marcación).

Invernada: 15 días antes del destete y antes de la época de incidencia (otoño-primavera).

Invernada y reposición (novillos, vaquillonas y toritos): 1er refuerzo a los 6 meses luego de la 2da dosis. Revacunación anual hasta los 2 años.

Transportes (remates, ferias): 15 días antes del transporte.

Ovinos y caprinos: Corderos/as y chivitos/as: 15 días antes del descole, señalada, castración, esquila.

Borregas preñadas: 1er dosis 60 días antes del parto. 2da dosis 30 días antes del parto.

Ovejas y cabras preñadas: 30 días antes del parto.

Majada general y carneros, chivos/ castrones: 15 a 30 días antes de la esquila. Ingreso a verdeos o cambios de alimentación. En animales adultos vacunados se recomienda una dosis anual de refuerzo. En zonas de alta

incidencia de Clostridium novyi y Clostridium haemolyticum se recomienda la vacunación cada 6 meses. Se aconseja la revacunación ante cuadros de parasitosis gastrointestinales.

Conservación

Mantener entre 2 ºC y 8 ºC al resguardo de la luz. No congelar.

Presentación

Frascos de 125 mL y 250 mL.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.