

ZOETIS · VETERINARIA

Ultrachoice 8 – vacuna clostridial

Cód. V080067

Vacuna clostridial polivalente para bovinos y ovinos.

Composición

- Cada dosis (2mL) contiene un mínimo de: 2.28 unidades de opacidad de cultivo de C. chauvoei cepa F y un mínimo contenido flagelar de 0,6 unidades relativas; 32L+unidades de toxina pre-inactivación (UTAI) de C. septicum cepa A; 6000 MLD (Dosis Letal en Ratón) de C. novyi cepa 8296; 20L+ UTAI de C. sordellii cepa 5918; 300L+ UTAI de C. perfringens tipo C cepa PC8; 100L+ UTAI de C. perfringens tipo D cepa 317; 216L+ UTAI y 3.6 OU de cultivo de C. haemolyticum cepa IRP-135.

Indicaciones

Este producto ha demostrado ser eficaz para la vacunación de bovinos y ovinos sanos contra la pierna negra causada por Clostridium chauvoei, el edema maligno causado por C. septicum, la hemoglobinuria bacilar causada por C. haemolyticum, la enfermedad negra causada por C. novyi, la gangrena gaseosa causada por C. sordellii, y la enterotoxemia y la enteritis causadas por C. perfringens tipos B, C y D.

Modo de uso

Agite bien.

Bovinos: Administre asépticamente 2 ml por la vía subcutánea. Administre 2 dosis a intervalos de 4 a 6 semanas cada una. Para C. haemolyticum repetir la dosis cada 6 meses en los animales sujetos a reexposición.

Ovinos: Administre asépticamente 1 ml en el cuello por vía subcutánea, seguido por una segunda dosis de 4 a 6 semanas más tarde. Para C. haemolyticum repetir la dosis cada 6 meses en los animales sujetos a exposición a predios de riesgo. Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis para ambas especies indicadas.

Administración vía subcutánea.

Precauciones y restricciones

Almacene a 2–8°C. No congele. Utilice el contenido completo una vez abierto el envase. Disponer envases según regulación local.

Contiene formalina como preservante. Se puede presentar una inflamación local transitoria en el sitio de la inyección después de la administración. Los informes de campo indican que puede ocurrir una reducción transitoria en la producción de leche después de la vacunación.

Como con muchas vacunas, puede ocurrir reacción anafiláctica después de su uso. Se recomienda epinefrina seguida de terapia de soporte apropiada de acuerdo con el criterio del profesional actuante. No mezclar con otros productos.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consulte al Médico Veterinario.

No vacunar dentro de los 21 días previos al sacricio.

Presentación

Frasco x 50 dosis

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.