

BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

Biopoligen HS – vacuna respiratoria (por dosis)

Cód. V080085

Vacuna para prevenir el síndrome respiratorio bovino y cuadros reproductivos, neurológicos y entéricos asociados a los virus y bacterias de su fórmula.

Composición

Suspensión acuosa inactivada de herpesvirus bovino (BoHV) tipos 1 y 5, virus de la diarrea viral bovina (BVDV) tipos 1 y 2, virus de parainfluenza 3 (PI3), Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Histophilus somni.

Indicaciones

Vacuna para la prevención del síndrome respiratorio en bovinos (complejo de enfermedades respiratorias, fiebre del transporte, neumonía) y cuadros reproductivos, neurológicos y entéricos asociados a la acción individual o combinada de los virus y bacterias presentes en la composición.

Dosis y vía de administración

5 mL por vía subcutánea

Esquema de vacunación sugerido

Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

Terneros de destete convencional (primovacunación): Primera dosis: 45 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete.

Terneros de destete precoz: Primera dosis: 30 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete.

Animales transportados (primovacunación): Primera dosis: 45 días antes del transporte. Segunda dosis: 15 días antes del transporte.

Animales transportados (revacunación): 15 días antes del transporte.

Animales que ingresan a invernada o feedlot: Vacunar al ingreso; si no tienen antecedentes de vacunación previa, revacunar a los 15-21 días.

Vacas y vaquillonas gestantes: Primera dosis: 60 días antes del parto. Segunda dosis: 30 días antes del parto.

Conservación

Mantener entre 2 ºC y 8 ºC al resguardo de la luz. No congelar.

Presentación

Frascos de 125 mL y 250 mL.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.