

BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

Bioleptogen – vacuna contra leptospirosis (por dosis)

Cód. V080088

Vacuna para prevenir la leptospirosis en bovinos y porcinos; incluye 7 serovares de Leptospira.

Composición

Suspensión acuosa inactivada de serovares de Leptospira interrogans: Canicola canicola, Icterohaemorrhagiae copenhageni, Grippotyphosa grippotyphosa, Pomona pomona, Sejroe hardjo, Australis bratislava y Tarassovi tarassovi.

Indicaciones

Vacuna para la prevención de la leptospirosis en bovinos y porcinos.

Dosis y vía de administración

Bovinos: 5 mL por vía subcutánea por delante o detrás de la paleta.

Porcinos: 3 mL por vía intramuscular profunda en el cuello detrás de la oreja.

Esquema de vacunación sugerido

Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

Bovinos. Terneros: Primera dosis: 4 meses de vida.

Segunda dosis: 5 meses de vida. Se sugiere revacunar 6 meses después de la última aplicación.

Vacas/vaquillonas y toros sin vacunación previa: Primera dosis: 60 días previos al servicio. Segunda dosis: 30 días previos al servicio.

Otras categorías: 1 dosis de refuerzo anual. Se sugiere aplicar una dosis de refuerzo a las hembras preñadas al momento del tacto.

Porcinos. Cachorras al primer servicio: Primera dosis: 60 días antes del servicio. Segunda dosis: 30 días antes del servicio.

Cerdas madres (revacunación): 10 a 15 días del inicio de la lactancia.

Padrillos sin vacunación previa: 2 dosis con 30 días de intervalo.

Padrillos (revacunación): 1 dosis cada 6 meses.

Conservación

Mantener entre 2 °C y 8 °C al resguardo de la luz. No congelar.

Presentación

Frascos de 125 mL y 250 mL.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.