

BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

Biopoligen Q – vacuna respiratoria y queratoconjuntivitis (por dosis)

Cód. V080089

Vacuna para prevenir el síndrome respiratorio bovino y la queratoconjuntivitis infecciosa (Moraxella bovis).

Composición

Vacuna conteniendo cepas inactivadas de: Herpesvirus bovino 1 (BoHV-1) (≥ 1,0 x 107 DICT50, Virus de la diarrea viral bovina 1 (DVB-1) (≥ 2,0 x 106 DICT50), Virus de parainfluenza bovina 3 (PI3) (≥ 1,0 x 107 HADS), Pasteurella multocida tipo A (≥ 2,5 x 109 bacterias), Mannheimia haemolytica (≥ 1,3 x 109 bacterias), Histophilus somni (≥ 2,5 x 109 bacterias), Moraxella bovis (≥ 5,0 x 107 bacterias), Gel de Hidróxido de aluminio y Excipientes c.s.p 5 ml.

Indicaciones

Vacuna para la prevención del Síndrome Respiratorio bovino (Complejo respiratorio bovino / Fiebre del transporte / neumonía) asociado a la acción individual o combinada de los virus y bacterias presentes en la composición. Vacuna para la prevención de la Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina.

Dosis y vía de administración

5 mL vía subcutánea en tabla del cuello o detrás de la paleta

Esquema de vacunación sugerido

Primovacunación (cualquier categoría que reciba esta vacuna por primera vez): 2 dosis con un intervalo de 21 a 35 días.

Terneros de destete convencional (primovacunación): Primera dosis: 45 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete.

Terneros de destete precoz: Primera dosis: 30 días antes del destete. Segunda dosis: 15 días antes del destete. Animales transportados (primovacunación): Primera dosis: 45 días antes del transporte. Segunda dosis: 15 días antes del transporte.

Animales transportados (revacunación): 15 días antes del transporte.

Animales que ingresan a invernada o feedlot: Vacunar al ingreso; si no tienen antecedentes de vacunación previa, revacunar a los 15-21 días.

Vacas y vaquillonas gestantes: Primera dosis: 60 días antes del parto. Segunda dosis: 30 días antes del parto

Conservación

Mantener entre 2°C y 8°C al resguardo de la luz. No congelar.

Presentación

Frascos de 100 ml (20 dosis) y 250 ml (50 dosis).

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.