

MSD SALUD ANIMAL · VETERINARIA

Cacique – pomada curabicheras cicatrizante (pote 950 g)

Cód. V100001

Pomada curabicheras, cicatrizante y antiparasitaria externa a base de cipermetrina.

Descripción

Antiparasitario externo. Curabicheras

Indicaciones de uso

Como antimiásico: Para el tratamiento de las heridas agusanadas ó “bicheras” de los bovinos, ovinos, porcinos y equinos.

Como preventivo: Aplicar sobre heridas recientes, provocadas por la castración, descorne, señalada, esquila, etc.

Como curativo: Para el tratamiento de las heridas agusanadas ó “bicheras” se deben cubrir íntegramente las cavidades y superficies de las mismas con el fin de eliminar las larvas repitiendo el tratamiento a los 3 ó 4 días y luego a intervalos semanales hasta la curación de la herida.

Precauciones de uso

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación. Usar guantes de goma. Luego de la aplicación, lavar las partes del cuerpo que estuvieron en contacto con el producto con abundante agua y jabón. Entre la última aplicación y el sacrificio del animal para consumo alimentario humano deben transcurrir no menos de 3 días. Entre la última aplicación y el ordeñe del animal para consumo alimentario humano deben transcurrir no menos de 3 días.

Almacenamiento y eliminación: Almacenar en su envase original cerrado, fuera del alcance de los niños, mascotas y personas inexpertas. No almacenar ni transportar con alimentos. Preservar de las heladas (0˚C) y del calor excesivo (35˚C). El descarte del producto o de su envase vacío debe realizarse de acuerdo a las normativas nacionales, estatales y/o municipales. Inutilizar los envases vacíos perforándolos. Requerir información local para su destrucción.

PRIMEROS AUXILIOS

Salpicaduras en los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por al menos 15 minutos. Llamar al médico.

Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. No aplicar pomadas, ni cremas, ni aceites. Llamar al médico. Síntomas: irritación de los ojos y la piel, puede provocar picazón que luego desaparece.

En caso de ingestión: beber abundante agua:2 litros con carbón activado y 1 litro con sulfato de sodio al 3%. No dar nada de beber a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Llamar al médico.

NOTA PARA EL MEDICO

Ante la ingestión accidental del producto, llamar inmediatamente al médico y no suministrar al afectado substancias grasas, ni leche. Lleve el envase al médico.

Contiene: Cipermetrina. Grupo químico: piretroide. Antídoto: no tiene; aplicar tratamiento sintomático. Contiene Ácido salicílico (antiinflamatorio no esteroide (AINE).

Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160. Centro Toxicológico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez-CABA Tel 4962-6666. Centro de Toxicología –Rosario–Santa Fe Tel (0341) 446 0077. Hospital de Niños –Córdoba Tel (0351) 422 9961 y 423 3303 int 136.

Est. Elaborador Ňº8.252.

Fabricante: ATANOR S.C.A.

Albarellos 4914 (B1605AFR), Munro, Pcia. de Buenos Aires,

Argentina. Tel.: +54 11 4721 3400 –Fax: +54 11 4721 3480 www.atanor.com.ar.

Modo de uso

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.