

BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

Bagomectina 1 % – ivermectina inyectable x 500 ml

Cód. V100013

Antiparasitario interno y externo inyectable (ivermectina 1 %) para bovinos, ovinos y porcinos: parásitos gastrointestinales y pulmonares, sarna, piojos y miasis.

Acción

Antiparasitario interno y externo para bovinos, ovinos y porcinos, que combate los parásitos gastrointestinales, pulmonares, sarna, piojos, ura y miasis. Solución inyectable de ivermectina al 1%.

Composición

Ivermectina, 1 g; excipientes, c.s.p. 100 mL

Indicaciones

Bovinos. Parásitos internos. Parásitos gastrointestinales: Bunostomum phlebotomum (adultos, L3 y L4); Cooperia oncophora (adultos y L4); Cooperia pectinata (adultos y L4); Cooperia punctata (adultos y L4); Cooperia spp (adultos y L3); Haemonchus placei (adultos, L3 y L4); Mecistocirrus digitatus (adultos); Nematodirus helvetianus (adultos); Nematodirus spathiger (adultos); Oesophagostomum radiatum (adultos, L3 y L4); Ostertagia (Teladorsagia) lyrata (adultos y L4); Ostertagia (Teladorsagia) ostertagi (adultos, L3 y L4 incluyendo larvas inhibidas); Strongyloides papillosus (adultos); Trichostrongylus axei (adultos y L4); Trichostrongylus colubriformis (adultos y L4); Toxocara vitulorum (adultos).

Parásitos pulmonares: Dictyocaulus viviparus (adultos, L4 y estados inhibidos).

Ectoparásitos. Sarna: Acariosis cutánea producida por Psoroptes communis var. bovis; Sarcoptes scabiei var. bovis; Chorioptes bovis.

Piojos chupadores: Haematopinus eurysternus; Linognathus vituli; Solenopotes capillatus.

Miasis: Dermatobia hominis (ura); Hypoderma bovis; Hypoderma lineatum. Como tratamiento coadyuvante en el control de piojos masticadores (Damalinia bovis).

Otros parásitos en los que la ivermectina ha mostrado actividad: Parafilaria bovicola (adultos); Thelazia spp (adultos); Chrysomyia bezziana.

Ovinos. Parásitos internos. Parásitos gastrointestinales: Haemonchus contortus (adultos, L3 y L4); Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta (adultos, L3 y L4); Ostertagia (Teladorsagia) trifurcata (adultos y L4); Trichostrongylus axei (adultos); Trichostrongylus vitrinus (adultos); Trichostrongylus colubriformis (adultos, L3 y L4); Nematodirus spathiger (L3 y L4); Nematodirus filicollis; Cooperia curticei (adultos, L3 y L4); Oesophagostomum venulosum (adultos); Oesophagostomum columbianum (adultos, L3 y L4); Chabertia ovina (adultos, L3 y L4); Thichuris ovis (adultos); Strongyloides papillosus (L3 y L4); Gaigeria pachyscelis (adultos, L3 y L4).

Parásitos pulmonares: Dictyocaulus filaria (adultos); Protostrongylus rufescens (adultos).

Gusano de la cabeza: Oestrus ovis (todos los estadios larvales).

Ectoparásitos. Ácaros de la sarna: Psoroptes communis var. ovis; Sarcoptes scabiei var. ovis; Psorergates ovis.

Porcinos. Parásitos internos. Parásitos gastrointestinales: Ascaris suum (adultos y L4); Hyostrongylus rubidus (adultos y L4); Oesophagostomum spp (adultos y L4); Strongyloides ransomi (adultos); Trichuris suis (adultos).

Parásitos pulmonares: Metastrongylus spp (adultos).

Parásitos del riñón: Stephanurus dentatus (adultos y L4).

Ectoparásitos: Piojos: Haematopinus suis.

Ácaros: Sarcoptes scabiei var suis.

Dosis y vía de administración

Bovinos: 1 mL cada 50 kg de p.v. (200 mcg/kg) por vía subcutánea con una aguja 12/18.

Ovinos: 0,5 mL cada 25 kg de p.v. (200 mcg/kg) por vía subcutánea con una aguja 10/12, en la piel floja detrás de la paleta o en la ingle, en la cara interna del muslo.

Porcinos: 1 mL cada 33 kg de p.v. (300 mcg/kg) por vía subcutánea, en la piel laxa detrás de la oreja o en la ingle, en la cara interna del muslo.

Período de retiro

Entre el último tratamiento y la faena para consumo deben transcurrir:

Bovinos: 35 días.

Ovinos: 35 días.

Porcinos: 18 días.

No aplicar en vacas lecheras en lactación ni dentro de los 28 días previos al parto cuando la leche se destine a consumo humano o industrialización. No utilizar en ovejas en lactación cuando la leche se destine a consumo humano o industrialización.

Presentación

Frasco x 500 mL.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.