

BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

Fortium – gel antiparasitario oral para equinos, multidosis x 240 ml

Cód. V100014

Antiparasitario interno y externo para equinos: gel oral de amplio espectro con ivermectina y praziquantel, de buena palatabilidad y fácil aplicación.

Acción

Antiparasitario interno y externo para equinos. Gel de amplio espectro que combina ivermectina y praziquantel para ser administrado por vía oral. De excelente palatabilidad y con facilidad de aplicación.

Composición

Ivermectina, 1 g; praziquantel, 7,5 g; excipientes, c.s.p. 100 mL

Indicaciones

FORTIUM está indicado para combatir los siguientes parásitos tanto en sus formas adultas como inmaduras.

Grandes estróngilos: Strongylus vulgaris (adultos y estadios larvales arteriales); Strongylus edentatus (adultos y estadios tisulares); Strongylus equinus (adultos); Triodontophorus spp (adultos).

Pequeños estróngilos: Cyathostominae (adultos y L4) de las siguientes especies: Cyathostomum spp; Cylicocyclus spp; Cylicostephanus spp; Cylicodontophorus spp; Gyalocephalus spp; Poteriostomum spp.

Otros parásitos internos: Parascaris equorum (adultos, L3 y L4); Oxyuris equi (adultos y L4); Trichostrongylus axei (adultos); Strongyloides westeri (adultos); Habronema muscae (adultos); Habronema majus (adultos); Anoplocephala perfoliata; Anoplocephala magna; Paranoplocephala mamillana.

Parásitos del cuajo: Gasterophilus nasalis (L2 y L3).

Parásitos pulmonares: Dictyocaulus arnfieldi.

Habronemosis cutánea (llagas de verano) causadas por: Habronema muscae; Habronema majus; Draschias spp en sus estadios larvales cutáneos L3.

Dermatitis causadas por filáridos (microfilariae): Onchocerca cervicalis.

Garrapatas: Ayuda en el control de Amblyomma cajenense y Dermacentor nitens.

Dosis y vía de administración

1 g cada 50 kg de p.v. (200 mcg de ivermectina/kg de p.v. y 1,5 mg/kg de p.v. de praziquantel). Administrar exclusivamente por vía oral. Para una correcta administración del producto, calibrar la jeringa dosificadora de acuerdo al peso del animal a tratar.

Instrucciones de uso

Abrir la boca del animal colocando los dedos sobre el morro y el pulgar sobre el paladar ejerciendo una suave presión. Retirar la tapa de la cánula e introducir la jeringa en la boca buscando dejar la cánula sobre la base de la lengua, luego apretar el émbolo suavemente. El equino saboreará la esencia y deglutirá el gel. Evitar la administración en forma enérgica para disminuir la posibilidad de falsa vía.

Período de retiro

No destinar los animales tratados al consumo humano hasta transcurridos 14 días del último tratamiento.

Seguridad

A la dosis indicada, puede ser administrado en equinos de todas las edades, incluso en yeguas en cualquier estado de preñez. La fertilidad y la calidad del semen de los padrillos no se ven afectadas. No tiene efecto teratogénico.

Presentación

Envase multidosis x 240 mL.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.