

BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

Galmetrin Plus Spray – curabicheras en aerosol x 440 ml

Cód. V100075

Antiparasitario externo. Larvicida, repelente, antimicrobiano y cicatrizante en aerosol, para bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos. Antiparasitario externo en aerosol indicado en la prevención y tratamiento de las miasis cutáneas (“bicheras” o “gusaneras”) provocadas por las larvas de Cochliomyia…

Acción

Antiparasitario externo. Larvicida, repelente, antimicrobiano y cicatrizante en aerosol, para bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos.

Composición

Cada 100 g de concentrado contiene: cipermetrina, 1,6260 g; imidacloprid, 0,8200 g; sulfadiazina de plata, 0,0995 g; excipientes, c.s.p. 100 g. Propelente: propano/butanos.

Indicaciones

Antiparasitario externo en aerosol indicado en la prevención y tratamiento de las miasis cutáneas (“bicheras” o “gusaneras”) provocadas por las larvas de Cochliomyia hominivorax en bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, equinos y caninos. Repelente, antimicrobiano y cicatrizante. Puede ser utilizado en el tratamiento de heridas y en forma preventiva después de la castración, descole o descorne, en el ombligo del recién nacido y en maniobras quirúrgicas.

Dosis y vía de administración

Pulverizar a 10 o 15 cm de distancia sobre la herida y sus bordes. Aplicar de modo que el producto cubra la totalidad de la lesión y la alcance en profundidad. Generalmente, 5 a 10 segundos resultan suficientes.

Tratamiento de miasis: Una aplicación diaria hasta la curación de la herida, generalmente durante 4 o 5 días. En casos de miasis graves, se recomienda retirar las larvas de las zonas afectadas y realizar la limpieza previa de la herida para favorecer la penetración del producto.

Prevención de las miasis y cicatrizante: En general una única aplicación es eficaz, pero esto puede variar según el tipo de herida y las condiciones ambientales. El intervalo entre dosis y la duración del tratamiento podrán ser modificados a criterio del médico veterinario interviniente.

Administración por pulverización local externa.

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Período de retiro

No posee periodo de retiro en carne ni leche

Contraindicaciones

No administrar en felinos

Presentación

Suspensión en aerosol de 440 mL/260 g.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.