

BIOGÉNESIS BAGÓ · BIOGÉNESIS

Paraxane inyectable – ricobendazol 10 % x 1 l

Cód. V100094

Antiparasitario interno inyectable de efecto ovicida para bovinos (ricobendazol 10 %), contra parásitos gastrointestinales y pulmonares.

Acción

Antiparasitario interno inyectable de efecto ovicida para bovinos.

Composición

Ricobendazol, 10 g; excipientes, c.s.p. 100 mL

Indicaciones

Tratamiento y control de las siguientes especies de parásitos gastrointestinales y pulmonares en el ganado bovino: Haemonchus spp, Ostertagia (Teladorsagia) spp (incluso las formas hipobióticas), Trichostrongylus spp, Cooperia spp, Nematodirus spp, Oesophagostomum spp, Bunostomum spp, Dictyocaulus spp. PARAXANE INYECTABLE es efectivo en un rango superior al 99% contra los parásitos adultos y superior al 94% contra formas inhibidas. Acción prolongada (96 hs.), amplio margen de seguridad y gran poder ovicida (a partir de las 6 hs. pos tratamiento).

Dosis y vía de administración

Aplicar por vía subcutánea exclusivamente, delante o detrás de la paleta. Se dosifica a razón de 2,5 a 8 mg/kg de p.v.

Se aconsejan las siguientes dosis: 1 mL cada 40 kg de peso y hasta 1 mL cada 12,5 kg de peso, de acuerdo al ciclo parasitario y al criterio del profesional actuante.

Dosis	100 kg	200 kg	300 kg	400 kg
Parásitos adultos	2,5 mL	5 mL	7,5 mL	10 mL
Larvas hipobióticas	8 mL	16 mL	24 mL	32 mL

Período de retiro

Debido a su formulación de larga acción y a su permanencia en los tejidos, no se puede enviar a faena para consumo humano hasta transcurridos 49 días del último tratamiento. Entre el último tratamiento y el destino de la leche para consumo humano y/o industrialización deben transcurrir 120 horas (10 ordeñes).

Presentación

Envase x 1 L.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.