

MSD SALUD ANIMAL · VETERINARIA

Metricure – cefapirina intrauterina (x 10)

Cód. V160001

Antibiótico intrauterino a base de cefapirina para el tratamiento de la endometritis en vacas.

Descripción

Antibiótico intrauterino de amplio espectro.

Propiedades

: Cefapirina, una cefalosporina de primera generación es un antibiótico de amplio espectro con acción bactericida contra gérmenes gram-positivos y gram-negativos.

Cefapirina resiste a la acción de la penicilinasa y es activa en un ambiente anaeróbico, tal como el que se encuentra en un útero infectado. Después de un solo tratamiento con Metricure, concentraciones de cefapirina en el tejido endometrial por encima de la CIM de bacterias sensibles se mantienen al menos 24 horas. Los animales toleran bien la suspensión. La suspensión permite una buena difusión de la cefapirina en el endometrio y se infunde fácilmente.

Indicaciones

- Metricure se prescribe para el tratamiento de endometritis subaguda y crónica en vacas (al menos 14 días después del parto) causada por bacterias sensibles a la cefapirina. Patógenos importantes de endometritis sensibles a la cefapirina son:
- Actinomices (Corynebacterium) piogenes, bacterias anaeróbicas tales como
- Fusobacterium necrophorum y anaerobios gram-negativos de pigmentación negra. Metricure también se puede utilizar para el tratamiento de vacas repetidoras (en caso de más de tres inseminaciones no exitosas) si se sospecha que infecciones bacterianas son la causa de infertilidad.
- Dosificación y administración:
- El contenido de la jeringa Metricure se introduce en el lumen del útero usando el catéter desechable incluido.
- – Fijar la jeringa al catéter.
- – Con una mano enguantada introducida en el recto, tomar el cuello del útero.
- – Pasar el catéter por el cuello haciendo suaves movimientos oscilantes e introducirlo en el lumen del útero.
- – Inyectar Metricure.
- En general, un solo tratamiento con Metricure es suficiente para una cura completa.
- Con vacas inseminadas, Metricure se puede usar transcurrido 1 día de su inseminación.
- En caso de piómetra, antes de aplicar Metricure conviene un tratamiento con prostaglandinas para la inducción de la luteólisis y la remoción de desechos de la cavidad uterina.

Contraindicaciones

- Animales con conocida alergia a las cefalosporinas.
- Período de espera: Tejido comestible: 24 horas
- Leche: ninguno.
- Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente (15-25°C)

Datos generales

Cada jeringa contiene	Cefapirina (benzatínica) 500 mg, excipientes, c.s.p. 19 g

Modo de uso

Dosis según el rótulo y la ficha oficial del fabricante. Consultá al veterinario antes de aplicar.

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.