

AVIAR · VETERINARIA

Flunixin Meglumina

Cód. V260019

Antiinflamatorio no esteroide con potente acción antipirética y analgésica.

Características

- Especie: Bovinos, Equinos, Porcinos
- Acción Farmacológica: Analgésicos, Antiinflamatorios
- Contenido: 10 ml., 50 ml.
- Aplicación: Inyectable
- Composición: Cada mL contiene: Flunixina (como meglumina): 50mg. Excipientes c.s.p.

Descripción

Antiinflamatorio no esteroideo (NSAID) con potente acción antipirética y analgésica. Inhibidor de las prostaglandinas. Tratamiento sintomático de las enfermedades musculoesqueléticas (artrosis, artritis) en procesos infecciosos en general. Coadyuvante en el tratamiento del Síndrome mastitis-metritis-agalaxia. Como antiinflamatorio y antipirético en la neumonía. Indicaciones: En bovinos, ovinos, porcinos y equinos en todos los casos en que esté indicada la terapia antiinflamatoria, antipirética y/o analgésica: mastitis, metritis, enfermedades respiratorias, síndrome MMA en porcinos, cólicos en equinos, afecciones musculoesqueléticas, shock endotóxico

Modo de uso

Bovinos y porcinos: 1.0 – 2.0 ml./45 kgpv IM. Equinos: 1ml./45 kgpv IM Precauciones No administrar el producto por vía intraarterial. La administración intraarterial puede ocasionar la aparición de incoordinación, ataxia, debilidad muscular que ceden rápidamente sin tratamiento. No administrar en equinos de carrera dentro de los 8 días previos a la competencia. No administrar a animales con antecedentes previos a la hipersensibilidad a la flunixina. No administrar en animales de menos de 3 días de edad. No mezclar en la jeringa con otros productos. No administrar por periodos superiores a 5 días. Restricciones de uso Carne: Bovinos y porcinos: 21 días. No administrar en equinos destinados al consumo humano. No administrar en vacas lecheras cuya leche sea destinada a consumo humano.

Presentación

Frasco x 50 ml

Información orientativa del fabricante. Consultá precio y disponibilidad en nuestras sucursales.